

la boule au ventre

30 ans, avis sur l'apparition d'une tumeur de la paroi abdominale gauche.

contraception orale arrêtée il y a 2 mois pour un désir de grossesse.

Un garçon né par césarienne en 2012.



Apparition d'une tuméfaction de la paroi abdominale antérieure au niveau des muscles larges (oblique externe).

Lésion légèrement douloureuse mais ne nécessitant pas à l'heure actuelle de traitement antalgique.


Lésion en échographie évaluée à 5 cm

CAT

Janvier 2015




T1 gado fat sat



04/02/1984
30 AN
F



A

NEX:1
EC: 1
SE
FA: 180
TR: 540
TE: 12
AQM: 192\192



H



F



Hypothèse diagnostique et CAT

RCP




Validation biopsie guidée par l'imagerie




Prolifération à cellules fusiformes dont l'aspect morphologique et le profil immunohistochimique sont en rapport avec une tumeur desmoïde.

Pas de mutation exon 3 CTNNB1 (bêta caténine)

Du fait de l'absence de mutation de l'exon 3 de CTNNB1 retrouvé, le cas a été relu de manière collégiale à la réunion RRePS du 08 décembre 2014 qui confirme le diagnostic de tumeur desmoïde.






IRM :Fibromatose
profonde typique



inclusion dans le protocole WAIT AND SEE.


Juillet 2015



progression à la fois clinique et sur l'imagerie (30% de progression).

RCP

- Sortie de l'étude Wait and See.
- Introduction d'un traitement par CELEBREX 200 mg/jour.



Nouvelle progression

RCP

deuxième ligne de traitement par TAMOXIFENE 20 mg/j.

04/02/1984
31 AN
F

T1 TSE TRA SPAIR GADO

16/12/2015 17:23:25



102364407

83,66mm

LOC: 48,30

Ep: 5 SP: 6


FFS



Progression

Chirurgie : résection de la paroi abdominale antérieure et avec une reconstruction prothétique qui devra être encrée sur l'aile iliaque.

Alternative : cryothérapie





04/02/1984
32 AN
F

A

NEX:3
EC: 1
SE
FA: 171
TR: 580
TE: 9,70
AQM: 156\320

Page: 16 sur 30





mars 2016 : cryothérapie dans le cadre de l'essai CRYO-DESMO.

épisode d'acné douloureuse au courant du mois de septembre, avec des douleurs en particulier dans le territoire crural, elle ne prend à l'heure actuelle aucun traitement antalgique.

A arrêté toute contraception.

A rendez-vous avec le Professeur X à la maternité en vue d'une programmation de grossesse.

Palpation abdominale retrouvant une masse rénitente d'une quinzaine de centimètres non douloureuse.

